

Användning av PHASE-20 vid läkemedelsgenomgång

Symtomskattningsskalan PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor) kan användas inför läkemedelsgenomgång för att identifiera symtom, tex biverkningar, som kan ha samband med läkemedelsbehandling hos äldre.

PHASE-20 är framtaget av Region Uppsala, men får användas fritt av andra vårdgivare med angivande av referens och utan att själva skalan ändras.

Förslag på användning


Inom Region Jönköpings län används i första hand, för både patient och personal, patientversionen av PHASE-20, [se PHASE-20 – patientversion](#). Formuläret finns som blankett i Cosmic och samt i formulärtjänsten på 1177.

Formuläret fylls i av patienten själv, eller med hjälp av närstående eller vårdpersonal, inför en läkemedelsgenomgång och överlämnas till ansvarig läkare. I formuläret bedöms ett besvär i taget, och den ruta som bäst överensstämmer med patientens upplevelse under de senaste två veckorna kryssas. Eventuella kommenterar noteras vid varje symtom. Instruktion för hur formuläret fylls i finns också på baksidan av blanketten.

Dokumentation i Cosmic

Dokumentationen i Cosmic kan göras av läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

Om formuläret fylls i med hjälp av personal som har tillgång till Cosmic så kan blanketten öppnas upp i Cosmic, fyllas i direkt och signeras:



Under det dynamiska sökordet Bedömningsinstrument (markera Ja under rubriken) finns ett sökord för PHASE-20:

stora under de senaste två veckorna:

PHASE-20   

Har enligt PHASE-20 besvärats måttligt av yrsel och andfåddhet, samt haft stora besvär med förstoppning